

Library
of the
Museum of Comp. Zoology

N° 7880.

[The text on this page is extremely faint and illegible. It appears to be a standard page of prose with multiple paragraphs. There are some faint markings and a small cluster of dark spots in the upper right quadrant of the page.]

Ü B E R
EINIGE VÖGEL VON CHILI,

BEOBSCHTET

IM

MÄRZ UND ANFANG APRIL 1827,

Friedrich Heinrich ^{VON} *baron*

F. H. VON KITTLITZ,

NATURFORSCHER DER EXPEDITION DES SENIAVIN.

(Gelesen den 3. März 1830.)

Bei der Kürze unseres Aufenthalts in diesem merkwürdigen Lande kann hier wol niemand eine Art Katalog der in dieser Jahreszeit die Küste bewohnenden Vögel erwarten, es kann immer nur die Rede seyn von dem zufälligen Ertrage der Bemühungen weniger Tage, worunter freilich diejenigen Arten zuerst erscheinen, die um jene Zeit am häufigsten sind. Inzwischen bedurfte es keines vollen Tages um mich in Erstaunen zu setzen über die Neuheit und Eigenthümlichkeit der dort vorherrschenden Formen, so sehr abweichend von denen anderer, uns mehr bekannter Theile, von Südamerika. Es scheint, dass nach der sehr abwechselnden Beschaffenheit des Bodens und der Vegetation jede der verschiedenen Gegenden auch ihre thierische Bevölkerung für sich hat: welcher Reichthum würde mir höchst wahrscheinlich zugeflossen seyn, wenn ich mehr zu sehen bekommen hätte, als die sehr einförmigen, waldlosen und zur Trockenheit besonders geneigten Umgebungen von Valparaiso. In denen von la Concepcion verweilten wir leider kaum über einen Tag, ich erinnere mich aber nirgends eine ähnliche

(Mem. Acad. imp. sci., St. Petersburg)
v. 1, liv. 2, June 1830

Mannigfaltigkeit und Menge von Vögeln geschn zu haben, als in dieser höchst anmuthigen, an der herrlichsten Waldung reichen Gegend. Den grösseren Theil von denen, so mir überhaupt dort vorkamen, bemühte ich mich vergebens während unseres längeren Verweilens bei Valparaiso wiederzufinden.

Ein im Allgemeinen die Vögel von Chili sehr charakterisirender Zug ist die auffallend vorherrschende Neigung vieler Arten, mit Vernachlässigung des Fluges auf dem Boden zu laufen. Nicht nur, dass gewissen Gattungen diese ganz besonders eigenthümlich ist, auch von den verschiedenartigsten anderen sehen wir einzelne hier einheimische Arten, die ihren Gattungsverwandten zum Trotz die geschicktesten Läufer abgeben. Ich allein bemerkte in meiner kurzen Anwesenheit; zwei vorzugsweise auf der Erde laufende Falken, einen desgl. *Tamnophilus*, zwei Fringillen, einen *Opetiorhynchus*, den Vogel, welchen ich *Parus humicola* genannt habe, zu geschweigen ganz der 3 Arten meiner neuen Gattung *Pteroptochos*, denen bei sonst ganz sperlingsartiger Natur die Flugfähigkeit völlig zu fehlen scheint. Auch die *Psittacara Patagonica* (Less. Vag. de la Coquille), welche im südlichen Chili sehr häufig ist, bietet diese Erscheinung dar, da man doch früher nur in Neuholland laufende Papageyen vermuthete. Rechnet man noch dazu das besonders zahlreiche Vorhandenseyn solcher Gattungen deren Species man auch anderswo vorzüglich laufen sieht, als die von *Sturnus*, *Icterus*, *Alauda* u. s. w. und die häufigen Sumpfvögel, so wird man sich den eigenthümlichen Eindruck denken können, den es macht, die überwiegende Mehrheit einer so zahlreichen gefiederten Bevölkerung zu Fuss gehen zu sehen.

Durch schön gefärbtes Gefieder scheint sich im Allgemeinen die Vogelwelt von Chili nicht auszuzeichnen, wenigstens unter den von mir bemerkten, herrschten bei weitem bescheidene, meist braune und graue Farben vor, — unter den ganz alltäglichen ist es nur der im ganzen Lande sehr häufige *Sturnus militaris* mit seiner schönen hochrothen Brust und der kleine Kolibri mit goldglänzendem Scheitel, die dem Reisenden als schöne Vögel allenthalben auffallen müssen.

Die Anzahl derjenigen Vögel, so ich in jener Zeit mir selbst verschaffen konnte, belief sich im Ganzen auf 46 Species, 23 andere bemerkte und unterschied ich deutlich, ohne ihrer habhaft werden zu können. Drei der Eingesammelten besass ich bereits aus Brasilien, unter den übrigen scheinen sich nur sehr wenige zu befinden, die zugleich Bewohner jenes Landes sind, und im Allgemeinen habe ich viel Ursache zu glauben, dass beinahe die Hälfte dieser kleinen Sammlung aus solchen neuen Arten besteht, die wenigstens im Sommer 1829 noch gänzlich unbeschrieben waren. Gleichwohl halte ich mich vor der Hand nur ermächtigt, die nachfolgenden 12 Species als neu zu beschreiben und abzubilden, über die übrigen wage ich noch nicht zu bestimmen, denn leider befinden sich diejenigen Werke, so die neuerlich bekannt gewordenen Vögel Südamerikas enthalten, für den Augenblick nicht hier und können nur mit grossem Zeitaufwand herbeigeschafft werden. Ich muss es also der Zukunft anheimstellen, in einer Fortsetzung dieses nur zu früh abbrechenden Aufsatzes noch diese oder jene Beschreibung und Abbildung folgen zu lassen, wobei ich auch die bereits bekannten Arten namentlich aufzuführen, und diejenigen Bemerkungen, die ich hin und wieder über ihre Lebensart u. s. w. zu machen Gelegenheit hatte, in Kürze mit anzubringen gedenke.

Bei der Aufzählung der einzelnen Arten sey es mir um mehrerer Bequemlichkeit willen vergönnt, mich an gar keine systematische Ordnung zu binden, als welche bei ihrer geringen Anzahl doch von keinem Nutzen seyn würde.

Phytotoma silens mihi. (S. die Abbildung.)

Kennzeichen der Gattung: Körperbau sperlingsartig; benachbart den Gattungen *Fringilla* und *Colius*.

Schnabel kurz, gewölbt, ohne Rückenkante, beide Kinnladen spitzig, Spitze der Oberkinnlade unmerklich übergekrümmt, die Ränder von beiden stark eingezogen und sägenartig gezähnt. Nasenlöcher rundlich, ganz am Grunde des Schnabels, von den Stirnfedern halb bedeckt. Zunge flach, obwohl fleischig,

lanzettförmig zugespitzt, an der Spitze weder hornartig noch gefasert. (S. die Abbildung).

Füsse sperlingsartig, mit ziemlich starken Nägeln, die Seitenzehen gleich lang.

Die einzige Art, so ich von dieser bisher noch fast fabelhaften Gattung angetroffen, hat so wenig von der freilich sehr flüchtigen Beschreibung des *Phytotoma Rara* von Molina, dass ich mich nur durch den sägeförmigen Schnabelrand bewegen liess, sie für gattungsverwandt zu nehmen, obschon es *Phytotoma Rara* selbst wol auf keinen Fall seyn kann.

Die obere Figur der hierzu gehörigen Abbildung stellt das wahrscheinlich vollkommene Männchen vor, die andere wird jeder von selbst für das Weibchen zu halten geneigt seyn, aber leider kann ich diess nicht durch eigene Ueberzeugung bestätigen, da ich bei zwei mit den übrigen in Gesellschaft geschossenen Exemplaren von dieser grauen Farbe trotz der sorgfältigsten Untersuchung keine Spur von Eierstock wahrnehmen konnte, und deshalb damals sie mehr für diessjährige, vielleicht noch ungemauerte, Männchen hielt, wie es überhaupt im Herbst zuweilen sehr schwer hält, die Geschlechtstheile der Vögel zu unterscheiden. Späterhin bin ich aber in jener Meinung wieder wankend geworden durch die Bemerkung, dass bei diesen beiden Exemplaren der Schnabel durchgängig etwas kürzer ist, als bei den anderen, was wieder mehr auf das Weibchen hindeuten möchte; — unfehlbar wird gegenwärtig dieser Vogel bald anderweitig bekannt werden, wo alsdann das Räthsel sich lösen wird.

Er scheint um die Weinbeerenzeit gar nicht selten um Valparaiso zu seyn, wenigstens bemerkte ich ihn dreimal in jener Gegend, zweimal in kleinen Gesellschaften und immer in verschlossenen Obstgärten, wodurch mir besonders das letzte Mal seine Jagd unmöglich wurde. Wie es scheint, kommt er um diese Zeit als Strichvogel von weitem her, denn er verschwindet alsbald wieder spurlos.

Uebrigens ist diess einer der trägsten Vögel, die ich je gesehn habe. Gewöhnlich sitzt er auf den Spitzen der Bäume in sehr aufrechter Stellung unbe-

weglich; dadurch, dass einer geschossen wird, lässt sein Nachbar auf dem nächsten Baume sich noch gar nicht stören. Weder einen Gesang noch sonst irgend einen Ton habe ich von diesem Vogel vernehmen können, und ihm daher den Namen *Ph. silens* gegeben, zum Gegensatz von *Ph. Rara*, das bekanntlich nach seinem Geschrei so benannt ist.

Als besondere Eigenthümlichkeit im inneren Bau ist eine sehr stark ausgebildete blasenartige Erweiterung des Mastdarms zu betrachten, die vielleicht der Gattung überhaupt zugehört. Der Magen ist wenig muskulös, dafür sehr geräumig, und enthielt bei allen Ueberreste von Weinbeeren und grünen Blättern, welche letztere dem ganzen Darmkanal eine grüne Farbe gegeben hatten, und die Hauptnahrung des Vogels scheinen, ganz wie es von der Gattung *Phytotoma* gemeldet wird. Auch die Schnabelränder erscheinen grün gefärbt, was allerdings zu bestätigen scheint, dass er Pflanzen absägen soll, obschon ich den Vogel nie auf dem Boden, sondern immer nur auf den Spitzen der Obstbäume in Gärten bemerkt habe.

Beschreibung: (Männchen.) Schnabel und Füsse gelblich hornfarben, ersterer nach oben zu ins schwärzliche ziehend, Augensterne hoch braunroth, Hauptfarbe des Oberleibes lerchengrau, Stirn und Vorderkopf stark rostroth, begrenzt von einigen schwarzen Längsstrichen, ein undeutlicher weissgelber Augenstreif, Backen und Seiten des Halses schwarz mit mehr oder weniger untermischtem Weiss, Vorderhals und Kinn rein weiss. Ganzer Unterleib schön hell gelbröthlich, an den Seiten mehr oder weniger lerchengrau (letzteres vielleicht ein Zeichen des Herbstkleides). Flügel schwarz, eine unregelmässige weisse Querbinde der kleinen Deckfedern, die grösseren zum Theil weiss gespitzt und rostroth gerändert, so wie die hintern Schwungfedern. Die vordern haben einen weissen Spiegelfleck ungefähr in der Mitte ihrer Länge. Schwanzfedern braunschwarz, die beiden mittelsten heller und braungrau gerändert, die übrigen sind von der Wurzel bis über die Hälfte ihrer Länge auf der inneren Fahne rostroth. Die äusserste hat einen schmalen weisslichen Vorsaum.

(Weibchen? oder junges Männchen?). Schnabel etwas kürzer und mehr grau von Farbe, Augensterne und Füße wie oben. Ganzes Gefieder lerchengrau, nur in der Mitte des Bauchs ein mehr oder minder deutlicher Anflug jener schönen röthlichen Farbe. Schwanzfedern wie am Männchen gefärbt, aber minder lebhaft.

NB. Ob die lappenartige Hervorragung an der Ecke des Unterkiefers, so auf der Abbildung angegeben, bloß dieser Art oder vielleicht der ganzen Gattung eigen sey, kann ich, wie natürlich, nicht bestimmen. Sie ist von mehr häutiger als hornartiger Substanz und wird bald nach dem Tode des Vogels sehr undeutlich.

Ganze Länge	7 Zoll	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels vom Mundwinkel bis zur Spitze . . .	5 Lin.	
„ „ Tarsus	7½ „	
„ der Mittelzehe (ohne Nagel)	6 „	
„ des Schwanzes	3 Zoll 1 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	3 „ 5 „	

Schwungfedern: die 3te und 4te die längsten.

Pteroptochos.

Kennzeichen der Gattung: Habitus benachbart den Gattungen *Troglodytes* und *Myothera*. (Vergl. *Turdus cyanurus* L., Buff. pl. enl. 355.

Leib merklich zusammengedrückt, zumal bei den kleineren Arten. Schenkel und Füße besonders stark.

Flügel sehr kurz und fast zugerundet, werden grossentheils bedeckt von den langen und mit geschlossenen Fahnen versehenen Federn des Hinterkörpers. Schwanz ziemlich kurz, stufenartig geordnet, wird beständig aufwärts getragen wie bei *Troglodytes*.

Bartborsten hinter der Schnabelwurzel und sowohl über als unter den Augen, treten indess bei einer Art mehr hervor als bei der andern.

Schnabel gerade, mittelmässig lang und stark, allmählig zugespitzt und kaum merklich ausgeschnitten, oben erhaben mit stumpfer Rückenkannte. Nasenlöcher seitwärts am Grunde des Schnabels, mit gewölbter hornartiger Bedeckung. Zunge wie bei der Gattung *Turdus*. (Siehe die Abbildung bei *Pt. Rubecula*).

Füsse verhältnissmässig sehr stark, Tarsus nur wenig länger als die Mittelzehe, die Seitenzehen gleich lang. Nägel gekrümmt und stark.

Diese Vögel scheinen von der Natur gar nicht zum Fliegen bestimmt zu seyn, ich sah sie ihrer kurzen Flügel sich nur zur Unterstützung des Laufs und zur Ausführung grosser Sprünge bedienen. Sie bewohnen vereinzelt das niedrige und besonders dichte Gebüsch, in dem sie sich sehr geschickt zu verstecken wissen und laufen mit ausserordentlicher Schnelligkeit über offene Stellen. Nur zuweilen sieht man sie auch auf niedrige Zweige hüpfen.

Ihre Nahrung besteht vorherrschend aus Pflanzensamen, zu deren Verdauung sie viele kleine Steine mit zu verschlucken pflegen, auch ist ihr Magen ziemlich muskulös.

Ich bemerkte im Ganzen folgende drei Arten dieser Gattung:

Pteroptochos Rubecula m. (S. die Abbildung).

Nur ein einziges Männchen erhielt ich von dieser Art bei la Concepcion, und weil es im dichten Gebüsch mit grosser Gewandtheit lief, war ich genöthigt, aus so geringer Entfernung darauf zu schiessen, dass es fast ganz verdorben ward und ich Mühe genug hatte, wenigstens eine anschauliche Abbildung davon zu geben. Nachher habe ich in der Gegend von Valparaiso mich vergebens nach diesem Vogel umgesehen, obgleich ich dort die beiden folgenden ziemlich häufig fand.

In dem ziemlich grossen und muskulösen Magen fand ich fast lauter Sämereien mit kleinen Steinen vermischt.

Beschreibung: Schnabel braunschwarz, die Füsse mehr schwärzlich fleischfarben, als dunkelbraun, Augensterne dunkelbraun. Zwischen Schnabel und

*

Augen einzelne unregelmässig gestellte und sehr feine Bartborsten, die am obern Augenlied sind fast kaum zu bemerken. Hauptfarbe des Oberleibes ein nur wenig ins olivenfarbige spielendes Braun, welches an den äussersten Steissfedern ins Lohgelbe übergeht. Kehle und Vorderhals, so wie ein breiter Streif über den Augen schön gelbroth. Die Brust und ein Theil des Unterleibes erscheint auf aschgrauem Grunde schwarz und weiss gebändert, die meisten Federn sind nämlich rein weiss mit zwei bis drei sehr deutlichen schwarzen Querbinden und zuweilen mit aschgrauer Spitze, welche letztere Farbe besonders nach den Seiten hin vorherrscht. Weiterhin am Bauche wird diese Zeichnung nach und nach immer undeutlicher und verliert sich ganz an den Schenkelfedern, welche allmählig die lohgelbe Farbe der unteren Schwanzdecken annehmen. Flügel- und Schwanzfedern sind braunschwärzlich mit höherem Braun gerändert.

Ganze Länge	7 Zoll 6 Lin.	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	7 „	
„ „ Tarsus	1 Zoll 2 „	
„ der Mittelzehe	7 „	
„ des Schwanzes	2 Zoll 6 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	3 Zoll	

Die Schwungfedern waren an dem einzigen Exemplar zu sehr durch den Schuss beschädigt, um ihr Verhältniss erkennen zu lassen.

Pteroptochos albicollis m. (S. die Abbildung.)

Da dieser Vogel in Grösse und Gestalt so wenig Abweichung vom vorigen zeigt, war ich anfänglich ganz bereit, ihn für das Weibchen desselben zu nehmen, bald aber fand ich unter diesem Gefieder beide Geschlechter, und obgleich ich ziemlich viele der Art bei Valparaiso zu sehen bekam, stiess ich doch nie auf ein Exemplar mit rother Kehle, vielmehr zeigten diese Vögel unter sich gar keine Verschiedenheit des Gefieders. Ich habe leider die vorige Art zu wenig im Leben gesehen, um auch Habitus und Lebensart vergleichen zu können. Der

gegenwärtige Vogel ist ziemlich häufig an den mit Strauchwerk bewachsenen Abhängen um Valparaiso herum, wo er fast beständig an der Erde umherläuft, nur selten sieht man ihn etwa einen niedrigen Ast besteigen. Fliegen sah ich ihn nie, wenn er sich verfolgt glaubt, läuft er bis zum nächsten Versteck mit ausserordentlicher Schnelligkeit und gewöhnlich mit Hülfe der Flügel. In ruhiger Stellung trägt er den Kopf sehr aufrecht und den Schwanz fast ganz perpendikulär, auch selbst wenn er geht. Wenn er auf seiner Flucht einen hinlänglich dichten Strauch erreicht hat, behauptet er diesen Zufluchtsort mit vieler Hartnäckigkeit. Einen eigenen Anblick giebt seine grosse Geschicklichkeit bergan zu laufen auf den steilsten Höhen. Gewöhnlich sieht man diesen Vogel einzeln, zuweilen aber auch paarweis. Seine Lockstimme besteht aus einzelnen ziemlich rauhen Tönen, die er nicht sehr oft hören lässt. In dem muskulösen Magen bemerkte ich nur vegetabilische Stoffe mit kleinen Steinen vermischt. Der Körper ist bei dieser, wie bei der vorigen Art, auffallend zusammengedrückt; das Fleisch ist sehr weiss und hat einen ganz eigenthümlichen unangenehmen Geruch.

Beschreibung: Schnabel und Füsse braunschwarz, Augensterne schwarzbraun. Bartborsten merklich stärker und zahlreicher als an der vorigen Art, doch weniger ausgebildet am Weibchen, das sich sonst in Grösse und Gefieder durch nichts unterscheidet. Die Hauptfarbe des Oberleibes ist mehr rostbraun als am vorigen Vogel, am Vorderkopf ins Braunrothe ziehend und zum Theil mit eirunden weissen Spiegelflecken in jeder Feder, die gemeinschaftlich einen weissen Augenstreif bilden. Flügel- und Schwanzfedern sind braunschwärzlich mit sehr breiter rothbrauner Einfassung, an den Spitzen der ersteren zeigt sich hin und wieder eine undeutliche Zeichnung mit Schwarz und Weiss, welche vielleicht wie bei so vielen Vögeln das herbstliche Gefieder bezeichnet. Die Grundfarbe des Unterleibes ist ein schmutziges Weiss, welches an Kehle und Vorderhals ungefleckt erscheint, je weiter nach den Schenkeln zu aber je stärker braun überlaufen und mit ziemlich regelmässigen schwarzbraunen Querbinden

gezogen ist, die an den Aftersfedern und Schwanzdecken zuletzt sehr undeutlich und viel kleiner werden.

Grösste Länge	7½ Zoll	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	7½ Lin.	
„ „ Tarsus	1 Zoll 2 „	
„ der Mittelzehe	6½ „	
„ des Schwanzes	2 Zoll 7 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	3 Zoll	

Schwungfedern: die 4te und 5te die längsten.

Pteroptochos megapodius m. (S. die Abbildung.)

Gewiss ein Vogel von auffallendem Ansehn, von dem man kaum vermuthen sollte, dass er so lange der Aufmerksamkeit der Naturkundigen entgangen sey. Denn er ist in den niedrigen Gebüsch um Valparaiso herum nichts weniger als selten, obschon er sich sehr versteckt hält und besonders die undurchdringlichen Dickichte einer Art von Bambusa (Linné) liebt, welche in jener Gegend grosse Stellen bedecken.

Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen, und mit wenigern und schwächeren Bartborsten an Schnabel und Augenliedern versehen, sonst konnte ich keinen Unterschied zwischen beiden finden. Wie der vorhergehende Vogel pflegt auch dieser nur sehr schnell und oft mit Hülfe der Flügel zu laufen, wenn er verfolgt wird. Fliegen sah ich ihn ebenfalls nie, auch nicht etwa von einem Zweige zum andern hüpfen, nur dann und wann einmal erscheint er, um sich umzusehen, mit einem plötzlichen Sprunge auf irgend einem hervorragenden Stock oder Ast, so wie die Abbildung ihn darstellt. Seine gewöhnliche Stimme, so wahrscheinlich sein Gesang ist, besteht aus einzelnen Tönen, die dem Knarren und Pfeifen eines ungeschmierten Rades nicht unähnlich sind, sie folgen in grossen und unregelmässigen Zwischenräumen auf einander und werden allmählig immer tiefer. Wahrscheinlich rührt auch von diesem Vogel ein gewisses

Geschrei her, welches aus einem einzigen oft wiederholten und sehr dumpfen Tone besteht, und welches ich oft in jenen Dickichten gehört habe, ohne mich überzeugen zu können, von wem es ausgehe.

Bei allen, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, bestand der Inhalt des muskulösen Magens zumeist aus Sämereien mit kleinen Steinen vermischt, doch fanden sich darunter auch Beeren von Myrthen u. s. w. und einzelne Stücke von grossen Insektenlarven.

Beschreibung: Schnabel und Füsse braunschwarz, die letzteren auffallend stark, alle drei Vorderzehen fast von gleicher Länge, die Nägel sehr lang und stark, besonders der der Hinterzehe, dabei nur leicht gekrümmt, zusammengedrückt und ganz stumpf. Starke Bartborsten und Augenwimpern. Augensterne dunkelbraun. Hauptfarbe des Gefieders dunkel rostgrau, am Rücken ins Braune übergelend, an der Oberbrust rostroth überlaufen, ein Streif über den Augen und ein desgleichen breiterer vom unteren Schnabelwinkel an den Seiten des Halses herab roströthlich weiss. Die Farbe des Unterleibs ist sehr gemischt, auf roströthlich aschgrauem Grunde stehen grosse röthlich weisse Flecken mit unregelmässigen dunkelbraunen Querbinden versehen, gegen die Seiten hin zeigt sich dabei ein stärkerer braunrother Anflug, so wie an den langen und flockigen Steissfedern, die an den äussersten Spitzen wieder undeutliche schwärzliche und weissliche Querbinden zeigen. Die grossen Flügel Federn sind von einem fahlen Braun und heller als der Rücken, die Schwanzfedern dunkelbraun, gegen die Ränder hin etwas heller.

Ganze Länge	9 bis 10	Zoll	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	1	„ 1 Lin.	
„ „ Tarsus	1½	„	
„ der Mittelzehe	1	„	
„ des Schwanzes	3	„ 1 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	3	„ 7 „	

Schwungfedern: die 4te und 5te die längsten.

Troglodytes paradoxus. m. (S. die Abbildung.)

Weil dieser Vogel sowohl in Haltung und Lebensart, als selbst, mit Ausnahme des Schnabels, auch in der Körperbildung so ganz die Eigenschaften der Gattung *Troglodytes* zeigt, so habe ich ihn vor der Hand noch nicht von derselben trennen wollen.

Auf jeden Fall ist es eine sehr merkwürdige Art, schade, dass ich nur ein weibliches, wahrscheinlich junges und noch dazu sehr beschädigtes Exemplar erhalten konnte. Ich glaube ihn im Ganzen zweimal gesehen zu haben, beide in der Gegend von la Concepcion, wo er sehr dickbuschigte Sträucher am Rande der Waldungen bewohnt. Hier sucht und findet er seine Sicherheit im Verstecken, so dass man sehr nahe bei ihm stehen kann, ohne ihm etwas anhaben zu können. Zuerst aber verräth ihn seine höchst sonderbare Stimme, die ein und denselben Laut mehrmals hinter einander in einem ungewöhnlich hohlen seltsamen Tone ausruft, und die man anfänglich vielmehr einem Frosch, als einem Vogel zuschreiben möchte. Er schlüpft sehr gewandt im Dickicht umher, und hat die Stellungen unseres Zaunkönigs. Den Magen fand ich etwas muskulös, mit vielen kleinen Käfern und Heuschrecken angefüllt.

Beschreibung: Schnabel grade, mittelmässig lang, spitz, unmerklich ausgeschnitten, an den Seiten zusammengedrückt, die Rückenante bietet zum Theil eine erhabene längliche Fläche dar, und hinter dieser eine kammartige Erhöhung, welche einen Einschnitt in die Stirn hervorbringt. Die Nasenlöcher, sehr seitwärts gestellt am Grunde des Schnabels, sind von einer grossen convexen Hornhaut fast ganz verborgen. Zunge wie bei *Troglodytes* u. a. Die Füsse sind ungewöhnlich stark, zeigen aber sonst keine Abweichung von denen der Troglodyten. Flügel-, Schwanz- und Steissfedern sind fast ganz wie an der vorherbeschriebenen Gattung, welcher dieser Vogel überhaupt ungemein nahe kommt, und ich würde ihn ohne Bedenken mit dahin gezählt haben, wenn er nicht die Flugfähigkeit gleich andern Vögeln besässe, auch zum Laufen nicht

eben angewiesen zu seyn scheint, wobei noch die Verschiedenheit seiner Nahrung in Betracht kommt.

An dem einzigen Exemplar, welches ich schoss, war der Schnabel einfarbig aschgrau, die Füsse sehr hell fleischfarben, der Augenstern dunkelbraun, das Gefieder am Oberleibe wie das eines jungen Vogels unregelmässig gewellt mit dunkelschiefergrau und rostgelblich, Flügel und Schwanz dunkelbraun, fast alle Federn gegen die Spitze hin mit einer undeutlichen schwarzen und rostgelblichen Zeichnung, Vorderhals und Brust aschgrau, an der Kehle ins Weissliche ziehend, der übrige Unterleib lohgelb.

Ganze Länge	5½ Zoll	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	5 Lin.	
„ „ Tarsus	7½ „	
„ der Mittelzehe	6 „	
„ des Schwanzes	2 „ 1 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	2 „ 3½ „	

Schwungfedern: die 3te die längste.

*Synnalaxis humicola, m. ** (S. die Abbildung.)

Ziemlich häufig auf den Bergen um Valparaiso, wo man den Vogel gewöhnlich paarweis antrifft; er lebt hier auf der Erde zwischen Gesträuch, läuft

*) Ich hatte anfänglich diesen Vogel so wie den nachfolgenden, wegen der grossen Uebereinstimmung ihrer Lebensart mit der der Gattung *Parus*, zu derselben gezählt, und erst unmittelbar vor Abdruck dieses Bogens konnte ich mich vollkommen überzeugen, dass beide doch wol nicht von denjenigen Vögeln getrennt werden dürfen, die bereits unter dem Namen *Synnalaxis* beschrieben sind. *Synn. Tupinieri* von Lesson, davon sich ebenfalls ein Exemplar in meiner Sammlung befindet, zeigt in Habitus und Lebensart dieselbe Annäherung an die Meisen; auch sein Schnabel ist eigentlich von den gegenwärtigen nicht verschieden, dadurch aber, dass die Nasenlöcher mit ihrer häutigen Bedeckung nur eines kleinen Theils, dahingegen am gegenwärtigen Vogel fast ganz, mit kleinen Federn bewachsen erscheinen, hatte ich mich bewegen lassen, beide für verschiedener zu halten, als sie wirklich sind. Auch die, wiewohl mehr muthmassliche, Bemerkung Temminks, dass die Vögel der Gattung *Synnalaxis* vorherrschend die Verborgenheit lieben sollen, was bei diesen 3 Arten sich durchaus nicht bestätigt, hatte mit zu diesem meinem Irrthume beigetragen.

schnell und viel, wobei er den Schwanz sehr aufrecht zu tragen pflegt, diess und die langen Steissfedern, auch einigermassen die Form der Flügel, geben ihm eine gewisse Aehnlichkeit mit den Arten von *Pteroptochos*, die mit ihm einen Aufenthalt haben. Doch unterscheidet er sich sogleich von ihnen durch seinen gut ausgebildeten Flug, den er auch auf der Flucht dem Laufen vorzieht, und im Allgemeinen ziemlich mit den Meisen gemein hat, wie überhaupt sehr vieles in Haltung und Betragen. Seine Lockstimme hat in den einzelnen Tönen Aehnlichkeit mit der unseres Zaunkönigs, zuweilen lässt er wie eine Art Gesang eine Menge dieser scharfen Töne rasch auf einander folgen, was wol nichts weiter, als ein verstärkter Lockton ist.

In dem sehr muskulösen Magen fand ich meist Körner mit vielen kleinen Steinen, doch auch Insekten und Ueberreste von Beeren.

Zwischen Männchen und Weibchen konnte ich keinen äusserlichen Unterschied finden; wiewohl ich einen ziemlich auffallenden in der Grösse unter den männlichen Individuen wahrnahm.

Beschreibung: Schnabel schwärzlich, Füsse hornfarben, Augenstern dunkelbraun. Gefieder an Scheitel, Rücken, Schultern, Steiss und grossen Flügeldecken braunröthlich grau, an Hals und Brust mehr aschgrau, letztere mit etwas undeutlichen helleren Längsstreifen gesprenkelt; über den Augen ein grosser röthlich weisser Streif, gegen die Stirn und Scheitel hin von einer Reihe schwarzer Längsstrichelchen begrenzt, deren andere sich auf weisslichem Grunde auch am Kinn zeigen; diese Federn haben etwas zugespitzte Form, wie sie sonst besonders der Gattung *Malurus* eigen zu seyn pflegt. Wangen und Zügel schwärzlich, weisslich gemischt. Die keilförmig geordneten, aber nicht zugespitzten Schwanzfedern sind braunschwarz, die beiden äussersten rostroth gerändert, die Schwungfedern dunkelbraun, die kleinen Flügeldecken zeichnen sich durch ein ziemlich starkes Rostroth aus, welche Farbe, nur in etwas schwächerem Tone, auch an den Bauch-, Seiten- und Afterfedern sich zeigt.

Ganze Länge	6 Zoll	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	6 Lin.	
„ „ Tarsus	7 „	
„ der Mittelzehe	5 „	
„ des Schwanzes	3 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	2½ „	
3te Schwungfeder die längste.		

Synnalaxis Aegithaloides m. (S. die Abbildung).

Hier eine noch mehr an die Meisen angränzende Art; sie bildet auf die auffallendste Weise den Uebergang zu dieser mehr der nördlichen Hemisphäre gehörenden Form, so durch gegenwärtige Gattung wahrscheinlich in Südamerika ersetzt wird. Erst spät habe ich mich entschliessen können, den hier erwähnten Vogel nicht wirklich noch zu jenen zu zählen, so sehr gleicht er ihnen an Gestalt, Betragen und Lebensart, auch die Bildung des Schnabels ist im Allgemeinen ganz die der Gattung *Parus*, nur die Form der Nasenlöcher hat mehr von *Synnalaxis*, indem sie länglicht und am obern Rande sehr dicht mit kleinen Federn bewachsen sind, inzwischen zeigt sich auch hier ein unverkennbarer Uebergang der einen Form in die andere.

Diesen Vogel sieht man nie auf der Erde laufen, sondern ganz nach Art der Meisen das niedrige Gebüsch durchstreichen, gewöhnlich zu etlichen Individuen gesellschaftlich, welche eine gewisse Verbindung unter sich halten, wobei man aber die häufigen Locktöne unserer Meisen vermisst. Nur sehr selten hört man seine Stimme, die der unserer Blaumeise nicht unähnlich ist. Er ist ziemlich gemein auf den Höhen um Valparaiso. Ich habe keine Verschiedenheit im Gefieder bemerken können.

Beschreibung: Schnabel schwärzlich, an der Wurzel fleischfarben, Füße schiefergrau, Augenstern schwarzbraun. Scheitelfedern schwärzlich, mit grossen rostbräunlichen Spitzenflecken. Ueber den Augen ein weisser Streif, durch dieselben ein undeutlicher schwärzlicher. Wangen und Hinterhals aschgrau und weiss

gemischt, Kehle weisslich, welche Farbe sich allmählich in der mehr rostgrauen des Unterleibes verliert, der Rücken ist von etwas dunklerem Rostgrau, so an den Schwanzdecken sich wieder etwas heller zeigt. Die Form des Schwanzes ist sehr eigenthümlich. Obgleich seiner Struktur nach keilförmig, erscheint er doch gabelförmig dadurch, dass die beiden ungewöhnlich langen an der Wurzel sehr breiten, nach der Spitze zu aber immer schmaler werdenden Mittelfedern gewöhnlich etwas auseinander stehen, indess die viel kürzeren und sehr stufenweis geordneten Seitenfedern sich zumeist unter jenen verbergen. Diese letzteren haben an der Spitze eine kleine Verlängerung des Schafts mit kaum sichtbarer Fahne, fast wie an der *Sylvia spinicanda* oder *Synnalaxis Tupinieri* (Less. Voy. de la Coquille). Diese Schäfte sind überall schwärzlich; sonst sind der Farbe nach diese Federn von der Wurzel an schief getheilt, die innere Abtheilung erscheint braunschwarz, die äussere an der äusseren Fahne weiss, an der inneren hellgraulich. Da der weisse Streif immer an Grösse mit der Länge der Federn abnimmt, so zeigen die beiden zunächst den mittelsten nur einen schmalen Rand von dieser Farbe, die mittleren selbst sind gegen die Spitze ganz schwarz und nur an den breiteren Theilen rostgrau gesäumt.

Ganze Länge	6½ Zoll	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	3½ Lin.	
„ „ Tarsus	4½ „	
„ der Mittelzehe	3½ „	
„ des Schwanzes	3 „ 5 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze .	2 „ 2 „	

2te Schwungfeder die längste.

Opetiorynchos rupestris m. (S. die Abbildung).

Ein häufiger Bewohner der felsigen Meeresufer, liebt besonders die an den Spitzen der Vorgebirge von der Brandung aufgethürmten Steinmassen, zwischen deren Klüften er mit grosser Leichtigkeit und ohne die mindeste Furcht vor den spritzenden Wellen umherschläft. Er hüpfet und läuft schnell und trägt den Schwanz beim Hüpfen etwas aufwärts. Sonst habe ich ihn einzeln auch an

steinigten Bächen und häufig an seichten Ufern der Küstenflüsse bemerkt, wahrscheinlich aber wird er nur die Nachbarschaft des Meeres bewohnen. An steilen Felsenwänden, die um seine Lieblingsplätze nie fehlen, sieht man diesen Vogel oft sich mit den Füßen anklammern, auch mit einiger Bewegung der Flügel ganze Strecken weit klettern, so dass ich anfänglich gar in ihm eine Art *Tichodroma* zu finden glaubte. Er lebt ungesellig, da er aber häufig ist, finden sich an den Plätzen, die er liebt, gewöhnlich mehrere zu gleicher Zeit. Seine Lockstimme, die man nicht sehr oft hört, hat einen scharfen Ton, im Ganzen aber wenig auffallendes. In dem ziemlich muskulösen Magen fand ich meist sehr kleine Conchylien und Wasserinsekten, doch auch, besonders bei einem Exemplar, verschiedene kleinkörnige Sämereien.

Beschreibung: (Männchen). Schnabel und Füsse sehr bräunlich fleischfarben, Augenstern schwarzbraun. Hauptfarbe oben dunkelbraun, unten bräunlich aschgrau, an der Brust mit schmalen weisslichen Längsstrichen bezeichnet. Ein starker und langer Streif über den Augen, Kehle und ein Fleck an den Seiten des Halses ziemlich rein weiss, Schwungfedern braunschwärzlich, gegen die Wurzeln hin mit einer schiefen und wenig zum Vorschein kommenden braungelben Binde bezeichnet. In dem sehr stufenförmigen Schwanz sind alle Federn zugespitzt, die drei äussersten mit einer schrägen weisslichen Zeichnung, sonst braunschwärzlich.

Das Weibchen ist wenig verschieden, es zeigt im Ganzen nur hellere Farben und am Bauche mehr schmutzig weiss, auch fehlen ihm die kleinen Längsstreifen an der Brust.

Ganze Länge	8 Zoll 3 Lin.	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	1 Zoll	
„ „ Tarsus	1 Zoll	
„ der Mittelzehe	6 „	
„ des Schwanzes	3 Zoll 2 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	3 Zoll 7 „	

Schwungfedern: die 3te und 4te die längsten.

Muscicapa Parulus m. (S. die Abbildung.)

Ein in Aufenthalt und Lebensart den Synnalaxen benachbarter Vogel, den ich indess gleich häufig an beiden von uns berührten Punkten von Chili antraf. Man bemerkt ihn fast überall sowohl in den schönen Waldungen bei la Concepcion, wo er bald hoch bald niedrig auf den Bäumen sich zeigt, als auf dem dürrn Gestrüppe der Höhen von Valparaiso, und ganz nahe bei den Wohnungen. Gestalt und Betragen sind ganz meisenartig, ich habe daher nicht unterlassen, durch die beigefügte Zeichnung des Schnabels zu zeigen, dass er dennoch eine wirkliche *Muscicapa* von der Untergattung mit längeren Beinen ist, deren in Brasilien ziemlich zahlreiche Arten ebenfalls im Habitus viel Meisenartiges zeigen. Auch fand ich in dem kleinen häutigen Magen nichts als sehr kleine Insekten. Man hört wenig Stimme von diesem Vogel, nur zuweilen einen leisen Lockton, welcher dem unserer Blaumeise nicht unähnlich ist.

Im Gefieder scheint kein Unterschied des Geschlechts stattzufinden, bei den Jungen ist die Zeichnung am Kopfe weniger regelmässig und nicht so schwarz.

Beschreibung: Schnabel und Füsse schwärzlich, Iris neapelgelb, Grundfarbe des Kopfes und Halses aschgrau, mit schwarz und weiss bezeichnet, Scheitelfedern in eine spitzige Haube verlängert, die die meiste Aehnlichkeit hat mit der von *Parus cristatus*. Hals und Brust fein schwarz gestrichelt. Unterleib blassgelb, Oberleib olivengrau; Flügel und Schwanz fahl braunschwärzlich.

Ganze Länge	4 Zoll 3 Lin.)	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	4 „	
„ „ Tarsus	5½ „	
„ der Mittelzehe	3 „	
„ des Schwanzes	1 Zoll 7 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	1 „ 7 „	

3te Schwungfeder die längste.

Muscicapa Pyrope m. (S. die Abbildung).

Es ist wol nicht zu verkennen, dass dieser Vogel zu der Untergattung *Tyrannus* gehört, wie schon die hier abgebildete Struktur der Spitzen der ersten Schwungfedern andeutet, die auch hier wie bei *Muscicapa Tyrannus*, dem weiblichen Geschlechte ganz zu fehlen scheint. Die gegenwärtige Art sah ich häufig bei Tomé in der Bay von Concepcion; hier flog sie einzeln und paarweis am Rande der bebuschten Anhöhen, auch in der Nachbarschaft der Häuser, und zeigte wenig Scheu. Um Valparaiso war sie selten, ich bekam sie dort nur ein- oder zweimal einzeln zu Gesicht und nie zum Schuss. Zwischen beiden Geschlechtern scheint kein Unterschied im Gefieder, und der in der Grösse nur zufällig zu seyn; ein Männchen fand ich fast um einen Zoll kürzer als das andere. Dieser Vogel sitzt gern auf den Wipfeln der kleinen Bäume, von da er von Zeit zu Zeit in die Luft emporflattert, um Insekten zu fangen. Einen Gesang hörte ich in dieser Herbstzeit nicht von ihm, wol aber einen einfachen flötenden Lockton, der eine schöne Stimme anzukündigen scheint.

Im Magen der von mir geschossenen fand ich nur mancherlei Insekten.

Beschreibung: Schnabel und Füsse schwarz, Augenstern prächtig feuerfarben. Ganzes Gefieder sehr weich und langfederig, oben aschgrau, unten weiss, an der Brust graulich, an den Seiten ein wenig rostfarbig angelauten; Flügel mattschwarz, mit weissgrauer Einfassung der grösseren Federn. (NB. Besondere Bildung der ersten Schwungfedern am Männchen, s. die Abbildung). Schwanz gerade, aschgrau, mit schwärzlichen Schäften und weisslicher Einfassung der äusseren Fahnen.

Ganze Länge	8½ Zoll		
Länge des Schnabels		7 Lin.	} Englisches Maas.
„ „ Tarsus	1 „		
„ der Mittelzehe		5 „	
„ des Schwanzes	3 „	6 „	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	4 „	5 „	

3te Schwungfeder die längste.

Fringilla Diuca (Molina). (S. die Abbildung).

Der eigentliche Sperling von Chili, in Körperbau, Habitus und ganzer Lebensart unserer *Fringilla domestica* auffallend ähnlich. Man trifft ihn in grossen Truppen, ganz wie diese, auf den Fahrwegen und in der Nähe der Häuser, auch in kleinen Gesellschaften überall auf den trockenen Höhen der Berge, welche die Küste begrenzen. Er setzt sich gern auf die Spitzen der niedrigen Büsche und läuft viel auf dem Boden. Seine häufigen Locktöne sind denen unseres Sperlings ziemlich ähnlich, seinen von Molina so gepriesenen Gesang habe ich nicht vernehmen können, wahrscheinlich weil die Jahreszeit nicht darnach war. In seinem Magen findet man meist Samenkörner, doch auch Insekten.

Der Unterschied im Gefieder, je nachdem die Hauptfarbe mehr ins Bläuliche oder ins Braungraue sich zieht, scheint mehr das Alter als das Geschlecht zu bezeichnen, man findet wenigstens auch Weibchen von sehr blauer und Männchen von ganz bräunlicher Farbe. Das abgebildete Exemplar gehört allerdings mehr der bläulichen Varietät an, obgleich man viel stärker ins blaue spielende, oder wenigstens rein aschgraue häufig findet; beide Verschiedenheiten sieht man unregelmässig durch einander gemischt.

Beschreibung: Schnabel und Füsse bläulich hornfarben, Augenstern dunkelbraun. Hauptfarbe bläulich aschgrau, mehr oder weniger braungrau überzogen, Kehle und Mitte des Bauches rein weiss, die erstere sehr scharf in der Färbung begrenzt, Afterfedern rostroth, die untern Schwanzdecken rostroth und weiss gemischt. Flügel braunschwärzlich, alle Federn graulich eingefasst. Schwanz gerade, von der Farbe der Flügel, die äussersten drei Federn mit Weiss bezeichnet, besonders auf der inneren Fahne.

Ganze Länge	6 Zoll 5 Lin.	} (Englisches Maas.)
Länge des Schnabels vom Mundwinkel bis zur Spitze	5 „	
„ „ Tarsus	7½ „	
„ der Mittelzehe (ohne Nagel)	5½ „	
„ des Schwanzes	3 Zoll 7 „	
„ „ Flügel vom Handgelenk bis zur Spitze	3½ „	

Schwungfedern: die 2te und 3te die längsten.

Crypturus perdicarius m. (S. die Abbildung.)

Ein in der ganzen Umgegend von Valparaiso häufiges und sehr geschätztes Wild, lebt in kleinen Gesellschaften an den Abhängen der mit kurzem Ge-
strüpp bedeckten Höhen, wo es fast wie unser Rebhuhn sich vor seinen Fein-
den auszudrücken pflegt, im Ganzen aber ist es flüchtiger als diess und lässt
sich selten ganz nahe kommen. Erst nachdem ein Individuum aufgeschreckt
worden, gehen nach und nach auch die anderen auf, so dass man nicht
leicht mit Bestimmtheit die Zahl der ganzen Gesellschaft erfährt. Dabei ha-
ben sie ungefähr den Flug unseres Rebhuhns, und wenn man das klappernde
Geräusch, welches dieses im Aufgehn verursacht, hier nicht völlig wiederfindet,
so fällt dafür destomehr das eigene durchdringende Geschrei dieser Vögel auf,
ohne welches sie nie sich aufjagen lassen. Man glaubt sehr deutlich die Syl-
ben: hihihihhi! — zehihe! — zehihe! — zehihe! zu hören, die in einem
äusserst starken, schneidenden Tone ausgerufen werden, die letzteren Worte
durch regelmässige Pausen getrennt, immer mehr abnehmend und gleichsam er-
sterbend.

Weil ich diesen Vogel für gemein und längst bekannt hielt, vernachlässigte
ich seine Jagd, und schoss überhaupt nur ein Männchen davon. Es scheint
nicht, dass zwischen den Geschlechtern ein auffallender Unterschied sey. An
dem Geschossenen fand ich den Kopf und Magen völlig hühnerartig (den letz-
teren sehr muskulös) und mit lauter grasartigen Sämereien angefüllt.

Beschreibung: Schnabel unmerklich kürzer als der Kopf, stärker ge-
bogen, als an den meisten Gattungsverwandten, besonders in der Mitte mit ei-
ner plötzlichen Beugung, die Nasenlöcher ziemlich weit ab von der Schnabel-
wurzel, mit welcher sie durch eine aufgetriebene Haut in Verbindung stehen.—
Schnabel fleischfarben, oben schwärzlich, die Füße hellfleischfarben, Augensterne
dunkelbraun. Die etwas längeren und breiteren Federn des Oberkopfs rostbraun,
jede mit einer deutlichen und scharf abgeschnittenen schwarzen Querbinde. Haupt-

farbe des ganzen Unterleibes eine helle, mehr oder weniger ins Graue spielende Isabellfarbe, an den Seiten des Kopfs und der Kehle ins weissliche, an der Brust mehr ins dunkel aschgraue, nach den Seiten zu hin und wieder unvollkommen bezeichnet mit den Charakteren der Rückenfedern. Diese sehr elegante Zeichnung besteht darin, dass jede Feder in ihrer Mitte einen breiten rostbraunen Spiegelflecken zeigt, auf welchem 3—4 einander umschliessende schwarze Querbinden von ungleicher Breite und Regelmässigkeit sehr deutlich gezeichnet sind, so wieder von zwei roströthlich weissen Längsstreifen begrenzt und eingeschlossen werden, auf welche hierauf zu beiden Seiten ein breiter Saum von röthlich aschgrauer Farbe folgt. Sehr vollkommen zeigt sich diese schöne Zeichnung an allen Rücken-, Schulter- und Steissfedern, unvollkommener und häufig unterbrochen an den obern Schwanz- und Flügel-Decken, die hinteren Schwungfedern und Aferflügel sind hellroströthlich mit schwärzlichen Quersflecken, die vordern Schwungfedern braunschwärzlich und röthlich weiss in die Quere gefleckt, mit flachen, glänzend schwarzbraunen Schäften.

Ganze Länge	11	Zoll	} Englisches Maas.
Länge des Schnabels	1	„ 2 Lin.	
„ „ Tarsus	1	„ 2½ „	
„ der Mittelzehe	1	„ 1 „	
„ des Schwanzes	2	„	
„ „ Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	6	„ 1 „	

Die 4te und 5te Schwungfeder die längsten.

ÜBER
EINIGE VÖGEL VON CHILI,

BEOBACHTET

IM

MÄRZ UND ANFANG APRIL 1827,

DURCH

F. H. VON KITTLITZ.

Fortsetzung.

(Gelesen den 10. October 1834.)

13. *Tamnophilus lividus mihi.* (S. die Abbildung.)

T. cauda aequali, furvus, gula albida, nigro striata, crisso ferrugineo, magnitudine merulae.

Dieser von den Gattungsverwandten ziemlich abweichende *Tamnophilus* nähert sich in Betragen und Lebensart einigermaßen der Gattung *Mimus* (Pr. Max von Neuwied), wie er denn auch mit dem dahin gehörigen *Turdus Thenca* Molina's einerlei Aufenthalt hat, nur ist er immer einzeln und nicht wie jener in oft zahlreichen Gesellschaften anzutreffen. Doch kommt er ziemlich häufig vor auf den flachen Höhen um Valparaiso, die mit einzelнем niedrigen Ge-
sträuch bewachsen sind, auch erhielt ich ihn während unseres kurzen Aufenthalts in der Bai von Concepcion. Er läuft meist auf dem Boden, seine Nahrung zu suchen, und ruht dann auf der Spitze irgend eines niedrigen Strauches in

^{5m} *Mém. des Sav. étrang. T. II.*

60

(Mém. Acad. imp. sci. St. Pétersbourg)
v. 2, livr. 4-5 Marsch 1835

einer ziemlich aufrechten, meist unbeweglichen Stellung aus. In dieser ist er nicht schwer zu schiessen, obwohl er im Laufe sehr flüchtig ist. Seine Stimme erinnere ich mich nie gehört zu haben; sein ganzes Wesen hat etwas Melancholisches und Einsames. Wahrscheinlich unterscheiden sich die Geschlechter nicht in der Farbe, da mir nie ein dergleichen Unterschied auffiel; übrigens erhielt ich selbst nur männliche Vögel der Art. In dem sehr muskulösen Magen fand ich bei Einem nur vegetabilische Nahrungsmittel, bei einem Andern aber noch mehr Insekten, zumal ziemlich grosse Käfer. Kleine Blinddärme sind vorhanden. Die Zunge ist ungefähr wie bei der Gattung *Turdus* gebildet.

Beschreibung. Schnabel hornfarben, gegen die Wurzel der untern Kinnlade hell fleischfarben, Füsse dunkelhorngrau, unten gelblich. Augenstern dunkelbraun. Hauptfarbe des Gefieders braungrau, oben dunkler, unten heller, mit wenig bemerkbaren dunkleren Schaftstriehen. Kinn und Kehle rostgelblich weiss, mit schwärzlichen Längestreifen. Sämmtliche Flügelfedern fahl dunkelbraun, heller gerändert; die 10 Federn des geraden und mittelmässig langen Schwanzes einfach dunkelbraun, die äussere mit schmalen weisslichem Rande, die zweite mit dergleichen Spitzensaume. — Die Unterflügel sind blässröthlich, Aftergegend und untere Schwanzdecken etwas stärker rostroth.

Englisches Maass.

Ganze Länge von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende	9 Zoll 6 Lin.
Länge des Schnabels	1 — 3 —
— — Tarsus	1 — 3 —
— der Mittelzehe	„ — 7 —
— des Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze . . .	4 — 6 —
— — Schwanzes	3 — 4 —

Die dritte und vierte Schwungfeder sind die längsten, die erste ist nur wenig kürzer.

14. *Sturnus aterrimus mihi.* (S. die Abbildung.)

St. ater nitens (rostro nigro), plumis frontis et genarum acuminatis, rigidis, menti filamentosis, cauda subaequali, magnitudine Turdi pilaris.

Diess mag wol der eigentliche *Turdus curaeus Molina's* seyn; am nächsten kommt er dem *Psarocolius sulcirostris* (Wagl.), den ich aber ebenfalls zu den Staaren zählen möchte. Die Haltung und Lebensart des gegenwärtigen Vogels bezeichnet ihn durchaus als hierher gehörig. Er zeigt sich um jene Zeit nur in kleinen Heerden von fünf bis zwanzig und mehr Stücken, die sehr regelmässig zusammenhalten und oft dicht gedrängt erscheinen. Diese fallen gern in Gärten und Gehölzen an steilen Abhängen ein, und während die Menge ihrer Nahrung nachgeht, werden immer einige Schildwachen ausgestellt. Wenn diese eine Gefahr bemerken, warnen sie den Trupp durch ein Geschrei, das mit dem unserer Staare viel Aehnlichkeit hat, und welches die Menge im Auffliegen zu wiederholen pflegt.

Dieser Vogel scheint unter Menschen sehr zahm zu werden; ich sah einen, der ganz frei im Hofe herumliief und nicht im mindesten scheu war. Dagegen ist er im Freien sehr vorsichtig und schwer zu schiessen; ich erhielt auch, obgleich er bei Valparaiso ziemlich häufig vorkommt, nur zwei Männchen davon, und weiss nicht, ob das Weibchen nicht vielleicht kleiner ist. In der Farbe möchte es kaum abweichen, da man nie andere als kohlschwarze Vögel in jenen Flügen bemerkt. Im Magen fand ich viel Körner und kleine Steine, doch auch Insekten.

Beschreibung. Der Schnabel erscheint nur von der Seite gesehn spitzig, von oben zeigen sich beide Kinnladen an der Spitze flach und zugerundet, die Firste ist oben niedergedrückt und bildet eine vollkommene Fläche. Es fehlt gänzlich an Bartborsten um die Mundwinkel und Nasenlöcher, dagegen gehen die Federn am Kinn in borstenartige Verlängerungen aus. An der Stirn und den Wangen sind die Schäfte sehr stark und die Federn zugespitzt. Der Schwanz

ist im Ganzen gerade, die erste Feder sowohl als die beiden mittelsten ein wenig kürzer, was eine Art von Wellenlinie hervorbringt. Das ganze Gefieder, bis auf die mattschwarze Unterseite der Schwungfedern, ist glänzend schwarz ohne farbigen Widerschein, Schnabel und Füße sind schwarz, der Augenstern schwarzbraun.

	Englisches Maass.
Ganze Länge von der Schnabelspitze bis zur Schwanzspitze	10 $\frac{1}{2}$ Zoll.
— des Schnabels	1 — 3 L.
— — Tarsus	1 — 3 —
— der Mittelzehe	„ — 7 —
— des Schwanzes	3 — 5 —
— — Flügels vom Handgelenk bis zur Spitze	5 — 1 —

Die dritte Schwungfeder ist die längste, die erste nur wenig kürzer.

15. *Alauda fissirostris mihi.* (S. die Abbildung.)

A. rostro elongato, mandibulis ad extremitatem divergentibus, supra furvescens, subtus albida, maculis pectoralibus nigris, remigibus intermediis pallide rufis, caudâ brevi.

Wie auffallend die Abtheilung ist, welche die afrikanischen Wüstenlerchen (Sirlis), *Alauda africana* L., *A. bifasciata* Lichtenstein u. s. w. bilden, um so interessanter erscheint uns eine hierher gehörige Art aus Amerika. Eine besondere Gattung aus diesen Vögeln zu errichten, möchte kaum rathsam seyn, da sie in allem wahre Lerchen sind und sich nur durch die Gestalt des Schnabels und die Nasenlöcher, welche nicht wie bei andern Lerchen durch überragende Federn bedeckt sind, unterscheiden. Die gegenwärtige Art ist ziemlich häufig auf den dürren Höhen um Valparaiso, aber erst da wo diese in Flächen ausgehen, die mit einzeltem Gestrüpp bewachsen sind; man trifft sie daselbst sowohl einzeln als in kleinen zerstreuten Gesellschaften, auch sah ich ihrer viele

an den vertrockneten Stellen des Flusses Concon. Flug, Haltung und Betragen bezeichnen eine ächte Lerche, ich sah sie niemals sich auf Büsche setzen. Den Schwanz bewegt sie im Gehen und Stehen fast beständig auf und ab, fast wie *Saxicola Oenanthe*, ohne ihn jedoch auszubreiten. Während sie niedrig über der Erde fliegt, hört man zuweilen ein aus mehreren zusammenhängenden Tönen bestehendes Geschrei von ihr, welches vielleicht ihr Gesang ist, aber mehr mit der Stimme der Staare als mit der der andern Lerchen Aehnlichkeit hat. Eine Verschiedenheit des Gefieders unter den Exemplaren habe ich nicht wahrnehmen können. Der Magen enthielt, so oft ich ihn gesehen, nur Körner und kleine Steine.

Beschreibung. Schnabel etwas gebogen, beide Kinnladen an der Spitze breit und stumpf wie bei den Staaren, die untere abwärts gebogen, wodurch der Schnabel vorn etwas klafft (*). Die Farbe hornschwärzlich, gegen die Wurzel des Unterkiefers hellfleischfarben. Der vorderste Theil der Stirn und ein Streif über den Augen sind roströthlich weiss, wie der ganze Unterleib; an der Brust stehen einige verloschene schwarze Flecke. Der ganze Oberleib ist hellrostgrau, die Flügeldecken und Schwungfedern dritter Ordnung, welche letztere sehr breit sind und die Spitze der Schwingen erreichen, sind fahl dunkelbraun mit breiter hellrostgrauer Einfassung und einem langen zugespitzten hellroströthlichen Fleck auf der innern Fahne der Schwungfedern; die der zweiten Ordnung fahl roströthlich, mit einer schwärzlichen Queerbinde; die der ersten eben so röthlich mit dunkelbrauner Einfassung. Der ziemlich kurze Schwanz ist gerade, die erste Feder auf der äussern Fahne weiss, gegen die Spitze der innern mit einem schwärzlichen Fleck, das Uebrige roströthlich, die zweite und dritte meist roströthlich und gegen die Spitze beider Fahnen schwärzlich, die Mittelfedern dunkelbraun hellrostgrau gerändert. Die braunschwärzlichen Füsse haben mittel-

(*) Diese sehr eigenthümliche Schnabelbildung ist nicht etwa ein zufälliges Naturspiel, ich bemerkte sie gleichmässig an allen drei Exemplaren, die ich von dieser Art schoss.

mässig lange Zehen, die Nägel sind etwas breit, aber scharf und spitz, der der Hinterzehe ist nur wenig gebogen und ungefähr von der Länge der Zehe selbst. Der Augensterne ist dunkelbraun.

	Englisches Maass.
Ganze Länge	5 Zoll 4 Lin.
Schnabel	„ — 6 —
Tarsus	„ — 6 —
Mittelzehe	„ — 4 —
Flügel	3½ —
Schwanz	2 —

Die zweite Schwungfeder ist die längste, die erste nur wenig kürzer.

16. *Fringilla arvensis mihi.* (S. die Abbildung.)

F. rostro, magnitudine et habitu Cannabinae, digiti posterioris ungue elongato, ptilosi supra passerina, abdomine lutea.

Nirgends bemerkte ich diesen Vogel als im Thal von Quillota; dort lebt er in grossen Schaaren auf flachen mit Disteln u. s. w. bewachsenen Feldern, und übernachtet mit den kleinen gelbschultrigen Staaren (*Xanthornus chrysocarpus Vigors*) im Rohr und Sumpfbüsch. In Flug und Betragen haben die langen und sehr gedrängt fliegenden Schaaren, deren ich mehrere an jenem Tage sah, viel Aehnlichkeit mit denen unserer Distelfinken: auch die Locktöne dieses Vogels glaubt man zu hören; wie bei diesem ist jeder einzelne für sich in steter Bewegung, fliegt auch für sich auf, und erst nach und nach kommt der ganze Schwarm zum Aufbruch. Im Gefieder scheint, wenigstens in dieser Herbstzeit, kein Unterschied des Geschlechts zu bestehen: ein sichtbar junges Exemplar, welches ich schoss, aber nicht conserviren konnte, war bloss am Unterleibe etwas heller und einfarbiger gelb. Der sehr kleine, wenig muskulöse Magen enthielt bloss ölbaltige Sämereien, die sich auch in Menge im Kropfe fanden.

Beschreibung. Schnabel hornbläulich, die gelbbraunlichen Füße haben sehr lange Nägel, besonders an der Hinterzehe, was eine Annäherung an die Gattung *Anthus* zeigt. Das Gefieder ist oben schwarzbraun, mit gelblich graubrauner Einfassung; an Schwung- und Schwanzfedern ist diese schmaler und etwas weisslicher, der Steiss ist ungefleckt und graugrünlich, Kehle und Vorderhals sind von einer rostgelblichen, allmähig übergehenden Farbe, davon ein Fleck an jeder Seite der Stirn steht, die Wangen bräunlich, die Seiten der Brust und des Bauches hellgelblich braungrau, die Mitte des Unterleibes wie die Unterflügel schön hellgelb. Augenstern dunkelbraun.

	Englisches Maass.
Ganze Länge	5 Zoll 1 Lin.
Schnabel	,, — 2 —
Tarsus	,, — 4 —
Mittelzehe	,, — 4 —
Flügel	2 — 7 —
Schwanz	2 —

Die erste, zweite und dritte Schwungfeder sind gleich lang.

17. *Anas chalcoptera mihi.* (S. die Abbildung.)

A. intermedia, capite (maris) castaneo, maculâ suboculari albâ, alarum tetricibus atro-viridi splendidibus, speculo purpureo nitente, splendore viridi admixto.

Ich habe nur das abgebildete Exemplar gesehen; diess war ein Männchen und flog, als ich es schoss, in einer kleinen Heerde von zehn bis zwölf Stücken, am süssen Wasser zunächst der Küste nicht weit von Valparaiso.

Beschreibung. Schnabel dunkelaschgrau, Füße schmutzig gelb, die Schwimnhäute schwärzlich bezeichnet, Augenstern dunkelbraun. Der Kopf ist

dunkelrostbraun, ohne bemerklichen Glanz, ein ziemlich grosser Fleck unter den Augen, die Kehle und ein halbmondförmiges Halsband sind weiss, der Unterkörper hellrostgelblich, dunkler gewässert und an den Seiten mit grossen länglich runden schwarzbraunen Flecken. Am Rücken sind die Federn theils rostgraulich, theils schwärzlich mit rostgrauer Einfassung. (Diess mag wol das herbstliche Gefieder bezeichnen.) — Der zugespitzte Schwanz ist schwarz, die Schwanzdecken rostgraulich. Sämmtliche Flügeldecken sind schön glänzend stahlgrün, der sehr breite Spiegel karmoisinroth glänzend mit schön grünem Widerschein und schwarz und weissem Spitzensaume. Die längste der hintern Schwungfedern auf der äussern Fahne sammetschwarz. Die Schwungfedern erster Ordnung sind einfach schwarz.

	Englisches Maass.
Ganze Länge	18 Zoll.
Schnabel	2 — 2 Lin.
Tarsus	1 $\frac{3}{4}$ —
Mittelzehe	2 —
Flügel	9 $\frac{1}{2}$ —
Schwanz	4 —



Phytoloma silens. n.
Chili.



Pteroptochos Rubecula n.
Chili.





J.C.B.

Pteroptochos albicollis n.
Chili






H.K.

Pteroptochos Megapodius n.
Chili.






HWK

Troglodytes paradoxus n.


Chili.





H. A.

Gynnotaxis humicola n.
Chili






H. K.

Synnalaxis aegithaloides n.
Chili



H. P.

Opetiorhynchos rupestris n.
Chili.





H. A. 2.

Muscicapa Parulus n.


Chili.





Pl. 11

Muscicapa Pyrope n.
Chiliv.






H. G. H.

Fringilla Diuca Mol.
Chili.





Crypturus perdicarius n.
Chili.





H. K.


*Ixos familiaris n.
Boninſima.*





Hbk

Sylvia diphone n.
Boninsima.



J.R.

*Fringilla Papa n.
Boninsima.*





Blk.

Oriolus squamiceps n.
Boninsima.



H. R.

Turdus terrestris m.
Boninsima.



Date Due

~~23 May 50~~

28 Jul 50

